

Тернопільський національний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль)

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19

Коваль Маріанна Євгеніївна

асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології

Мета дослідження:

встановити індивідуально-психологічні особливості УБД з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19

Матеріали і методи дослідження:

клінічно обстежено 252 учасники бойових дій, яким було встановлено діагноз непсихотичних психічних розладів.

Усі пацієнти були розділені на дві групи:

- 1) УБД, які не хворіли на COVID-19, чисельністю 132 особи (Г1);
- 2) УБД, які перенесли захворювання на COVID-19, чисельністю 120 осіб (Г2).


Дослідження проведено з використанням Мінесотського багатофакторного опитувальника особистості.

Статистичний аналіз виконано за допомогою тесту Манна-Уїтні

Показники за ММРІ в учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які хворіли та не хворіли на COVID-19

Шкали СМДО	Показники за шкалами, $M \pm m$ / Me (Q_{25} – Q_{75})		p
	Не хворіли на COVID-19	Хворіли на COVID-19	
1 (Надконтролю)	64,9±9,6 / 65,0 (55,0–73,0)	65,6±9,0 / 68,0 (58,5–74,0)	0,612
2 (Песимістичності)	67,0±18,6 / 74,0 (43,0–82,0)	74,9±10,0 / 75,5 (70,0–83,0)	0,047
3 (Емоційної лабільності)	59,0±7,1 / 57,0 (53,0–64,0)	61,5±8,3 / 60,0 (53,0–69,0)	0,020
4 (Імпульсивності)	53,6±4,6 / 51,0 (51,0–53,0)	55,7±6,2 / 53,0 (51,0–58,0)	0,016
5 (Мужності-жіночності)	54,3±3,5 / 53,0 (51,0–57,0)	55,1±3,3 / 55,0 (53,0–57,0)	0,016
6 (Ригідності)	56,6±5,6 / 56,0 (53,0–60,5)	56,2±6,1 / 56,0 (50,0–62,0)	0,369
7 (Тривожності)	72,3±10,8 / 74,0 (66,0–80,0)	76,9±10,6 / 78,0 (72,0–84,0)	0,001
8 (Індивідуалістичності)	62,0±6,6 / 64,0 (61,0–66,0)	61,8±7,5 / 66,0 (61,0–66,0)	0,257
9 (Оптимістичності)	43,6±10,1 / 40,0 (38,0–43,0)	40,7±6,1 / 38,0 (38,0–40,0)	0,003
0 (Інтроверсії)	60,6±6,2 / 60,0 (57,0–65,0)	62,2±6,2 / 63,0 (57,0–66,0)	0,024

Профіль особистості за ММРІ в учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які хворіли та не хворіли на COVID-19



Примітка: * - розбіжності статистично значущі, $p < 0,05$; ** - розбіжності статистично значущі, $p < 0,01$

Висновки:

1. Учасникам бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19, притаманні специфічні індивідуально-психологічні особливості, що можуть розглядатися в якості патохарактерологічних змін особистості.
2. Стрижневими характеристиками профілю особистості учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19, є стійкі тривожно-депресивні та гіпостенічні прояви та ознаки невротизації, а в якості допоміжних індивідуально-психопатологічних конструктів виступають стійкі астеничні, іпохондричні, емоційно-лабільні та дисфоричні прояви.
3. Виявлені особливості необхідно враховувати при плануванні лікувально-реабілітаційних заходів.