

**Динаміка поширеності хронічного
алкоголізму в Одеській області під час
пандемії COVID-19**

ДУ «Одеський обласний центр
контролю та профілактики хвороб
МОЗ України»

◎ **Метою** нашої роботи було вивчити наявність впливу пандемії COVID-19 на поширеність хронічного алкоголізму (далі – ХА).

◎ **Матеріали і методи**

В дослідженні використовувались дані статистичної звітності КУ «Одеський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Одеської обласної ради щодо захворюваності та поширеності ХА за останні 12 років (2009-2020рр.). Аналіз статистичних даних проводився з урахуванням адміністративного розподілу території Одеської області до реформи децентралізації 2020р. (6 міст та 26 районів). Обробку та аналіз матеріалів проводили за допомогою епідеміологічних, санітарно-статистичних методів.


Динаміка поширеності хронічного алкоголізму по Україні та Одеській області (2009-2020рр.)



Дослідження показало, що взагалі по Україні за 2009-2020рр., спостерігалось поступове щорічне зниження рівня поширеності ХА. За останні 12 років рівень показника знизився на 12,88%, зокрема за роки пандемії – на 2,05% (2019р. – на 0,89%; 2020р. – на 1,17%).

По Одеській області спостерігалася схожа ситуація. За 12 років рівень поширеності ХА поступово знизився на 9,82%, зокрема за роки пандемії – на 0,65% (2019р. – на 0,37%; 2020р. – на 0,28%). Однак, слід зазначити більш повільний темп зниження рівня показника по області у порівнянні з рівнем по Україні взагалі. Так, якщо у 2009р. обласний показник перевищував національний на 6,11%, то у 2020р. – вже на одну п'яту.

Динаміка поширеності хронічного алкоголізму по містах та сільським районам області Одеської області (2009-2020рр.)



По сільським районам області з 2009р. по 2020р. рівень поширеності ХА знизився на 4,77%, зокрема за час пандемії – на 0,61% (2019р. – на 0,19%; 2020р. – на 0,42%). Однак, по сільським районам області ситуація із поширеністю ХА не була настільки однозначною (зростання рівня показника було зафіксовано у 2014р. – на 0,20%, 2016-2017рр. – на 1,36%).

Слід зазначити, що окремо по адміністративним територіям поступове щорічне зниження рівня поширеності ХА спостерігалася тільки у містах Южному (12 років – на 17,88%; 2019-2020рр. – на 0,80%) і Теплодарі (12 років – на 59,21%; 2019-2020рр. – 26,60%), Овідіопольському (12 років – на 11,95%; 2019-2020рр. – на 2,68%) та Окнянському (12 років – на 46,39%; 2019-2020рр. – на 5,66%) районах. По інших адміністративним територіям спостерігались коливання рівня показника впродовж вивчаємого терміну.

◎ ВИСНОВОК

- ◎ За даними нашого дослідження виявлено загальну тенденцію по Україні та Одеській області до зниження рівня поширеності хронічного алкоголізму. Однозначного впливу пандемії COVID-19 на ступінь поширеності ХА виявлено не було.